

## RESUMO PRESCRIÇÕES PERMITIDAS POR ENFERMEIROS (AS)

MEDICAMENTOS INSUMOS	PERMITIDO PARA	POSOLOGIA	POR QUANTO TEMPO	INDICAÇÃO
<b>Acetato de retinol + Colecalciferol (50.000 UI/ml + 10.000 UI/ml) Solução oral</b>	Crianças de 0 a 6 meses	2 gotas 1X/dia	Uso contínuo (somente até 6 meses)	Complementação vitamínica na primeira infância
<b>Ácido fólico 5 mg comprimido</b>	Mulheres no período de pré concepção e gestantes	1 comprimido/dia	Uso contínuo (cada 6 meses renova prescrição se necessário)	Prevenção de defeitos do tubo neural. Iniciar pelo menos 30 dias antes da data em que se planeja engravidar e manter até o final da gestação.
<b>Albendazol 40mg/ml suspensão oral</b>	Prescrição para crianças acima de 2 anos (com mais de 10 kg) até 11 anos, 11 meses e 29 dias	10 ml (400 mg)	Dose única	Parasitose intestinal
<b>Azitromicina 500mg comprimido</b>	Mulheres e Homens Obs. parceiros (as) sexuais - prescrições individuais	2 comprimidos	Dose única	Cancro mole
<b>Azitromicina 500 mg comprimido + Ceftriaxona 500 mg IM</b>	Mulheres e Homens Obs. parceiros (as) sexuais - prescrições individuais	dose única (2 comprimidos, + 1 injeção de Ceftriaxona 500 mg) sendo administrado SOMENTE no CEDIC	<b><i>OBS esta prescrição deve ser atendida somente na farmácia do CEDIC na sua totalidade, portanto informar os usuários a procurarem o CEDIC de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 15:00h.</i></b>	Clamídia e Gonorreia

MEDICAMENTOS INSUMOS	PERMITIDO PARA	POSOLOGIA	POR QUANTO TEMPO	INDICAÇÃO
<b>Dimenidrinato 50 mg + Cloridrato de piridoxina 10 mg comprimido</b>	Gestantes	1 comprimido de 6/6 horas, se necessário (não exceder 400 mg/dia)	Por até 30 dias	Náuseas e vômitos
<b>Dipirona 500 mg/ml gotas</b>	Gestantes	30 gotas de 6/6 horas, se necessário	Por até 30 dias	Dor lombar ,dor pélvica e cefaleia
	Crianças maiores de 3 meses de idade até 11 anos, 11 meses e 29 dias	1 gota/kg/peso de 6/6 horas	Por até 5 dias	Febre, dor de ouvido sem febre e em bom estado geral, estomatite se dor ou febre (doença infecciosa aguda causada pelo Herpes vírus tipo 1 com transmissão pelo contato com a saliva contaminada ou através de lesões presentes), dor leve a moderada
	Crianças acima de 11 anos, 11 meses e 29 dias e adultos	30 gotas de 6/6 horas, se necessário	Por até 5 dias	
	Mulheres amamentando	30 gotas de 6/6 horas, se necessário	Por até 30 dias	Cefaléia e ingurgitamento mamário

MEDICAMENTOS INSUMOS	PERMITIDO PARA	POSOLOGIA	POR QUANTO TEMPO	INDICAÇÃO
<b>Doxiciclina 100mg comprimido</b>	Mulheres e Homens Obs. parceiros (as) sexuais - prescrições individuais (exceto para gestantes)	1 comprimido de 12/12h	Por 15 dias	Sífilis primária, Sífilis secundária, Sífilis latente recente (até um ano do contato) – Apenas para alérgicos a Penicilina
		1 comprimido de 12/12h	Por 30 dias	Sífilis latente tardia (mais de 1 ano do contato), Sífilis latente com duração ignorada, Sífilis terciária - Apenas para alérgicos a Penicilina
<b>Escopolamina 10 mg comprimido</b>	Gestantes	1 comprimido de 8/8 horas, se necessário	Por até 30 dias	Cólicas e dor abdominal
<b>Fluconazol, 150 mg comprimido</b>	Mulheres e parceiros (as) sexuais - prescrições individuais	1 comprimido	Dose única	Candidíase vulvovaginal
		1 comprimido 1X/dia	Nos dias 1, 4 e 7	Candidíase vulvovaginal recorrente (mais de 4 episódios no ano)
		1 comprimido 1X/semana	Por 6 meses	
<b>Glicosímetro, tiras, lancetas e lancetador</b>	Gestantes com suspeita ou confirmação de diabetes	4 testes ao dia até 150 tiras/mês	Até o final do puerpério (45 dias pós parto)	Diabetes Mellitus Gestacional e Diabetes Mellitus (Protocolo de atendimento DMG)

MEDICAMENTOS INSUMOS	PERMITIDO PARA	POSOLOGIA	POR QUANTO TEMPO	INDICAÇÃO
<b>Hidróxido de alumínio 40 mg/ml + Hidróxido de magnésio 30 mg/ml + Simeticona 3 mg/ml, suspensão oral</b>	Gestantes	10-15 ml (duas colheres de chá ou uma colher de sopa) após as refeições e ao deitar-se, se necessário	Por até 30 dias	Pirose e azia
<b>Ivermectina 6mg comprimido</b>	Em crianças a partir de 5 anos, com peso acima de 15 kg e adultos	Peso corporal (kg) - Dose oral única 15 a 24 kg: ½ comprimido 25 a 35 kg: 1 comprimido 36 a 50 kg: 1 ½ comprimidos 51 a 65 kg: 2 comprimidos 66 a 79 kg: 2 ½ comprimidos	Dose única	Pediculose e Escabiose

MEDICAMENTOS INSUMOS	PERMITIDO PARA	POSOLOGIA	POR QUANTO TEMPO	INDICAÇÃO
<b>Levonogestrel 0,75 mg comprimido</b>	Mulheres no período fértil	2 comprimidos de 0,75mg	Dose única	Anticoncepção hormonal de emergência
		1 comprimido de 0,75mg de 12/12 horas	Por 01 dia	
<b>Metronidazol 250mg comprimido</b>	Mulheres e parceiros (as) sexuais - prescrições individuais	02 comprimidos de 12/12 horas	Por 7 dias	Vaginose bacteriana e Tricomoníase
		08 comprimidos	Dose única	
<b>Metronidazol Gel Vaginal 100mg/g</b>	Mulheres	um aplicador (5g) à noite, via vaginal ao deitar-se	De 05 a 10 dias	Vaginose bacteriana

<b>MEDICAMENTOS INSUMOS</b>	<b>PERMITIDO PARA</b>	<b>POSOLOGIA</b>	<b>POR QUANTO TEMPO</b>	<b>INDICAÇÃO</b>
<b>Miconazol creme vaginal 20 mg/g</b>	Mulheres amamentando	Uso tópico nas mamas	Por até 14 dias	Candidíase nas mamas
	Mulheres	um aplicador (5g) à noite, via vaginal ao deitar-se	De 07 a 14 noites	Candidíase vulvovaginal
	Crianças e adultos de todas as idades	Aplicar após cada troca de fralda	De 7 a 10 dias.	Dermatite de fraldas
<b>Nistatina 100.000 UI/ML Suspensão oral</b>	Crianças até 11 anos 11 meses e 29 dias	1 ml a 6 ml de solução oral de 6/6 horas	Por até 9 dias	Monilíase Oral (candidíase)
<b>Óleo Mineral</b>	Crianças e adultos de todas as idades	conforme prescrição	Tempo determinado	Dermatite seborreica
<b>Palmitato de retinol + Colecalciferol + Óxido de Zinco Pomada</b>	Crianças e adultos de todas as idades	conforme prescrição	Tempo determinado (se for uso contínuo será informado na prescrição e renovada a cada 6 meses)	Prevenção de assaduras e dermatite amoniacal, intertrigo

MEDICAMENTOS INSUMOS	PERMITIDO PARA	POSOLOGIA	POR QUANTO TEMPO	INDICAÇÃO
<b>Paracetamol 200 mg/ml gotas</b>	Crianças maiores de 3 meses de idade até 11 anos, 11 meses e 29 dias	1 gota /kg/peso de 6/6 horas	Por até 5 dias	Febre, dor de ouvido sem febre e em bom estado geral, estomatite se dor ou febre (doença infecciosa aguda causada pelo Herpes vírus tipo 1 com transmissão pelo contato com a saliva contaminada ou através de lesões presentes), dor leve a moderada
<b>Paracetamol 500 mg comprimido</b>	Idem o medicamento Dipirona	Idem o medicamento Dipirona porém ao invés de 30 gotas é 1 comprimido	Idem o medicamento Dipirona	Idem o medicamento Dipirona
<b>Penicilina Benzatina 1.200.000 UI ampola</b>	Mulheres e Homens Obs. parceiros (as) sexuais - prescrições individuais	Conforme página 149 do Manual Saúde da Mulher	<b>Esta aplicação será realizada nas Unidades Básicas de Saúde</b>	Sífilis
<b>Permetrina 10 mg/ml loção</b>	Crianças acima de 2 anos e adultos	conforme prescrição	Tempo determinado	Pediculose
<b>Sais de reidratação oral</b>	Crianças e adultos de todas as idades	conforme prescrição	Conforme prescrição	Diarreia, suspeita de dengue ou dengue confirmada

MEDICAMENTOS INSUMOS	PERMITIDO PARA	POSOLOGIA	POR QUANTO TEMPO	INDICAÇÃO
<b>Soro fisiológico 0,9% solução nasal</b>	Gestantes	com 2 a 4 gotas em cada narina, 3 a 4 vezes ao dia ou o suficiente para manter as narinas úmidas, se necessário	Por até 30 dias	Epistaxe ou sangramento nasal
	Crianças e adultos de todas as idades	para uso nasal ou lavagem nasal (seringa de 20 ml)	Tempo determinado (se for uso contínuo será informado na prescrição e renovada a cada 6 meses)	Obstrução nasal por secreção e coriza
<b>Sulfato ferroso 200 mg = 40 mg de ferro elementar comprimido</b>	Gestantes e mulheres no pós parto e pós aborto	1 cp. 1X/dia desde o início do pré-natal até 3 meses pós-parto ou pós-aborto (uso contínuo) Exceções: anemia branda: 2 cp antes do café, 2 cp antes do almoço e 1 antes do jantar, uma hora antes das refeições. Até que a Hb atinja níveis ideais, quando deverá ser retomada a dose de suplementação (1 comprimido ao dia).	Uso contínuo (cada 6 meses renova prescrição se necessário)	Suplementação profilática de Ferro
<b>Sulfato Ferroso 125 mg/ml = 25 mg de ferro elementar gotas</b>	Crianças à partir de 30 dias até 11 anos, 11 meses e 29 dias	Conforme páginas 32 e33 do Manual Saúde da Criança e Adolescente	Uso contínuo (cada 6 meses renova prescrição se necessário)	Suplementação profilática de Ferro
<b>Vitamina A</b>	Crianças à partir do 6º mês até o 24º mês	Conforme página 31 do Manual Saúde da Criança e Adolescente	<b>É realizada a aplicação oral nas Unidades básicas de saúde</b>	Suplementação de Vitamina A

<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>DOSAGEM</b>	<b>DOSE MÁXIMA PARA RENOVAÇÃO</b>	
Anlodipino, besilato	5 mg	10 mg/dia	<b>SOMENTE RENOVAÇÃO POR ATÉ 6 MESES (183 dias)</b>
Atenolol	25 mg e 50 mg	100 mg/dia	
Captopril	25 mg	150 mg/dia	
Carvedilol	3,125 mg e 12,5 mg	50 mg/dia	
Enalapril, Maleato	10 mg	40 mg/dia	
Espironolactona	25 mg	100 mg/dia	
Furosemida	40 mg	80 mg/dia	
Glibenclamida	5 mg	20 mg/dia	
Glicazida	30 mg	120 mg/dia	
Hidroclorotiazida	25 mg	25 mg/dia	
Losartana	50 mg	100 mg/dia	
Metildopa	250 mg	1500 mg/dia	
Metformina, cloridrato	850 mg	2550 mg/dia	
Propranolol	40 mg	240 mg/dia	
Verapamil, cloridrato	80 mg	480 mg/dia	

**CONFECCIONADO PELO DAF – REFERÊNCIA MANUAIS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PIRACICABA**